

Therapie

A - G

PRESENTED BY
INTERDEPARTMENTAL
COMMITTEE

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
Bethesda, Maryland



Anämie, sekundär; Anämie d. Schilddr.
gumeration: Tonus fission; Fe, innerer Fer-
roandring: 2 wöchig. (3-5,0 pr. die) z. d.
Ferrum redüktion 3 x hzgl. 1,0. Ferrosta-
eol 3 x 2 tabl. Auf vollen Magen. Asper-
prip. ^{Füll. asiatische 1 hzgl. Thymus eil 6.} zur Linderung d. Fe Wirkung.
Sattessen, Götterklima.

Angina: ^{z. Wellen} Barangalipf: Sattessen, frische Göt-
terklima zw. 4-5 Wochen, Götterklima mit H₂O₂
od. frische. Rammellentum. wöhl. Götterklima d.
4-5 Wochen. Tonsilleralabszess: Subgl., am
flüßl. Nigulung. Bei Fluktuation Götterklima
parallel d. Götterklima, 1-2 cm tief, auf d. mit-
teilst. zw. Luft. Kollaren u. Lufte d. Lufte
ca, mit Götterklima wöhl. mit H₂O₂ od.
Rammellentum / Kollaren. Clair-Vincent: 1 x
Salvarsan i.v., Kollaren mit 5% Götterklima.

Angina pectoris: Im Auffall: 1% wöhl. li-
wöhl. Götterklima 10-15 Tropfen; Kollaren
Götterklima u. a. Auffall d. Kollaren: anti pab mo-
dipf Kollaren: Thebrominherb. (Kollaren)
3 x hzgl. 0,15; Dünnetinherb. 5 x hzgl. 0,5; Teo-
minol (Thebrom. 0,3 + Dünnetin 0,03). Dünnetin
u. d. Götterklima, d. Kollaren d. Kollaren

Asthma cardiale: Strophanthin i.v. 0,25
Atrioleas, Taufwischel, vorpflüg Dintont
car (Salyrgan 1 cm i.m.)

Asteriosklerose: Ururindum oder D. Kl. üben
auf den Grund der Farkel. von Zeit zu
Zeit völlige Rümpfungen, einige Oflor-
mittel (Loren, Aspirin, Adalin) ist er-
kennungsbildung; Akosol, Fenijs, Yim, Ju-
winge in pflücken, kinnen Rappen, Zi-
gerne ufw. Regulierung d. Darmstätig-
keit. kilden fofdotfuerpin. kunden.
ichor mit kinnend fof: jid. 2. kornet hgl.
eis zu 5 x 0,1 JK, in pflücken mit klen-
nen Dofen. Auf kinken ~ angina pectoris.

Asthma bronchiale: im Anfall: Adrenalin
1%o 1/2-1 cm s.c., Asthmolysin (Adren. + Hypo-
physin), Ephedrin od. Ephetonin 0,05 s.c.
od. 0,05 als Tabletten, Sympatol-Tabl. s.o. 1g.
Affenazigantum (Alkaloid + kithite)
Atropinkur: vorfand. 2 x hgl. 1/2 mg. ^(NLM) i.m.
Darmind: Calson per os od. Aferilinjektion.
koben fupm. JK 2,5: 150 3 x hgl. 1 ypl. Aufhäng
fotimpfindlichkeit! flukw. flüßigfladur,

zum Merk. Kommen. Rö auf der Seite.
Auf der Seite bekannter T für die Seite,
Ortswechsel

B

C

D

E

F

G

G

B

C

D

E

F

G

G

B

C

D

E

F

G

G



B

C

D

E

F

G

G

Encephalitis, akut: Entzündung, Diffusform, Trieb-
nig, Enzephal (0,5 kg. Enzephal auf 1 l
Wasser unter 70°, dann auf ein feines Sieb
geben. Einige Minuten stehen lassen, mit
Öl mischen.) Inhalation. Aufhängung d.
Lüft. Yspakthermion. formel: allgemein, i. v.
elektro. Lichttherapie, bei progressiver Erkrankung Sal-
zinn. Inhalation (Fukalysphä). Thermo-
tuning d. Flüssigkeitstherapie (Sofort, NaCl 10%)
Regelung d. Temperatur, Trennung d.
Jugend. Klimat. Räume: (W. D. 1000, 1000,
1000, 1000.)

Botulis unis: Karyogamspore, Fimbriae,
(aph. unis in Wasser) Rizinus, NaCl-Zut.
Strecke in vitro. J.C. 1-5 mg hyl., häufig
Karyogam 50-100 cm. i. m. od. 50 i. v. od. 20-
40 intr. Lumbal.

Brondiolitis acuta = capillänbrunfi his
bei Eintum frucht. Amis Schrift: Dampfbarkeit
gum, Lärn Lärn. Wpntu Tufpe: radix
Specacanthae (0,4:180) od. radix senegae
(5,0:180) [Lumpen. hyl. 1 ypl.] am Lärn mit
Lärn. am moni amisatus 3-4 x hyl. 5-10 Tr. in
Lärnplien zur Amung d. Lärnaktion.

Broudia haenkeana: ~~haenkeana~~: JK 5,0:150 upl. nris. Specas. 1. a.
inferior Broudiaeformis, fruct.: Broudiae infatium d. per os albi hng-
broudiae infer. hyl. 0,25

Enthverzungsmittelung mit Dr. Thillig.

Rp. argent. nitr. 0,1 ; Balsam. peruv. 1,0 ; wa-
ss. alb. ad 10,0. In Pfageadme 5-10' vor
Dr. Anlugen Anästhesiefallen. Ein vor Dr. Thillig
abgewaschen und der Dr. Thillig führen.

C

D

E

F

G

G

C

D

E

F

G

G

C

D

E

F

G

G

Capillärbronchitis: f. Bronchialitis acuta

Chorea minor: kindeskrankh., meist Töchter 5, 10, 15
Jahre. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
aufsteigend. alle 2 Tage. Brustschmerzen, Atemnot.
wird von agnathocytosegepfe. Der Kopf: Pp.
lig. cal. arthric. 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
körperliche mit psychischen Kräfte der Kräfte, wenig
und wenig.

C

D

E

F

G

H

D

E

F

G

H

D

E

F

G

G



D

E

F

G

H

Decubitus: algumin, Fäblichet/pinkte, Smit-
püder; küßt; Granulationsanregend: Efeuextr.
allen; tingt. Balsam. pers. 1:30.; Püder d. Vaseline.

Diarrhoe: Einwirkung auf D. Lumen: Atropin

Rp. extr. Belladonnae 0,02 14. p. suppos. D. Lumen
Papaverini hydroch. 0,03 doses h. VI, S. Lumen
olei cacao 2,0 S. auf 1 p. p. p.

Atropin, J. Lumen. J. Lumen. R. Lumen: L. Lumen
ginseng p. Talcum; J. Lumen. D. P. Lumen
L. Lumen. L. Lumen.

Diphtherie - Antitoxin - Antitoxin: L. Lumen

2 - 4 cc E, R. Lumen 5 - 8 000 E, R. Lumen 10 -
15 cc E, R. Lumen 20 - 30 000 E.

D

E

F

G

G

E

F

G

H



E

F

G

G



Epilupin: Samen, ent. KBr, 2,0 g pro die in 100 g
auf 6,0, Langform. drei feststehende Fällungen 15,0
NaCl kein Kopf; Präparat wie in 100 g
2,0-3,0 pro die. drei mal 2-3 x tägl. 0,1
- 0,15, Präparat 3 x 0,05.

Epilupin: Samenmittel: Apomorphin (be-
richtet) Apomorphin, per os in 504.

Epilupin: Markonika, Endosider. Versuch
Rp. Apomorphini hydrochlor. 0,05 g, dest. ad 10,0
N.D. circa 5, 1-2 mal zu injizieren.

Empipell: Genucosil

lokal indiff. Salzen, abh. Kuppelungen,
Zirkulation, inoffiz. Therapie

Endocandilis simplex: 1. hyocandilis
acuta.

Epilupin (Bläufun, ~~mit~~ wässert, ~~mit~~ wässert). drei-
ten mit Salicylat + Rizinol (10:30) ab-
gehen, dann 10%ige 4, 10%ige. ~~kurz~~ fallen: Rp. liq.
alumin. subcit. 10,0, Quercusrin 15,0, ca-
sch. flav. + Lactin ad 100,0. ~~in~~ in 100 g
in 100 g, 3 Tage lang tägl. lang ab-
gehen 3. Tagtägl. fallen 3. Tag mit Thiothol
kur: Rp. naphthalen 2,0-5,0 (aber 2-3 Tage ~~kur~~-
gen auf 10,0; 20,0; 30,0 aber nur, wenn keine
Bläufun da ist); ~~in~~ in 100 g, 100,0, 100,0

E

F

G

G

Urethra 10,0. ^{Urethra} Pflanze für Bepflanzung
Der 1. Thierpflanzungsanlage. mit Pfl.
von der Pflanze einzuweisen. Bei Tüpfeln
pro Lumen 0,1 Lumen. " ist. Tu-
net auf 3% Pflanze. (Zurückgegr.).

7

5

5

15
5
5

F

G

G

5

5

D. pfungf. Hbd. paffion Sauerungungun, Stänne
Simpff Thätung d. kein. auf Hbd. pfungf.
allgemein: 60 - vaccine, Rimmirpf auf wof
Abklingun d. pfungf. am Gelnuk. Abophang
i. v. oft pfungf. linterd.

Genococcensepsis: Trypaflavin, Fülner
gin (Silenopsp.) i. v.

Gastritis, akuta: 1-2 Tage Nahrung, kohlgl.
Ulcerationen zu vermeiden. Lept. Acid. hydrochlor.
dilut. 3 x tgl. 20-30 gH. wärmend d. y-führend
Emetica: 3. Dr. Apomorphin. hydrochlor. 0,1
aque dest. ad 10,0; ½-1 cem Subcut.; im An-
fall Abförmittel. chronica: reichhaltig d.
nährfl. Speisen; Diät: annehmen alles fähig
z. fettg. Nahrung (reife Tafel, Süßholz) Röhren
(reife Quark) Röhren, Jodid od. Jodsalz, Jod,
Jod. Juncus, Jodid u. Röhrenfluss. Alle Speis-
en zu kochen, viele kleine Mahlzeiten.
Röhren. Acid. hydrochl. dilut. p.o.; Tadelmann p.d.

Grippe: Inkrüfte eis einige Tage nach Yuffin
erwärmung; Eipolzen, Fugelinom ufw. Viel trinken.
Krankungen mindern 12. Trüffentlich offen
u. d. 3. d. Coffein. natr. Benzoi. 2-3 pil. 1 ccu s. c.
Strophantia 0,50-0,75 i. v. natr. täglich. Soni Guettina
mit fünfzig Chininvertheilung 0,5 i. m. Jung. neural
grippe auf finden in J. Rukonowaleitung: Chinin
aufpunkt: Rp. Chinin. hydrochlor. 5,0; acid. arse-
nicos. 0,2 mass. pil. q. s. ut f. pil. lw. 100 3x hyl 1 pil.
oder Compositum ~~(MBK)~~ (MBK) ferrum cum
acid. arsenicos. compos. 2-3 x hyl. 1-3 Thärb.
Elimin. kaffeebitter.



